

**\*35.1 : Pelouses atlantiques à Nard raide et communautés apparentées**

*Violion caninae* - Nardion

**Statut :** intérêt communautaire prioritaire – 6230  
- si riche en espèces -

PRIORITE : I



LE MOAL T. - Plateau du Cayan

ESPECES CARACTERISANT LOCALEMENT CET HABITAT

<i>Festuca rubra</i>	<i>Plantago lanceolata</i>	<i>Galium saxatile</i>
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	<i>Thymus serpyllum</i>	<i>Veronica chamaedrys</i>
<i>Conopodium majus</i>	<i>Lotus alpinus</i>	<i>Luzula campestris</i>
<i>Nardus stricta</i>	<i>Trifolium repens</i>	<i>Brachypodium pinnatum</i>
<i>Potentilla erecta</i>	<i>Vaccinium myrtillus</i>	<i>Achillea millefolium</i>
<i>Galium verum</i>	<i>Crocus nudiflorus</i>	<i>Dactylis glomerata</i>
<i>Hieracium nilosella</i>		

DESCRIPTION

Pelouses acidiphiles denses, rases, des replats et bas de versants, généralement établies sur sols profonds, acides ou décalcifiés. Elles constituent l'essentiel des pâtures des pâtures à bovins de l'étage montagnard sur le site.

CONDITIONS STATIONNELLES

Altitude : étage montagnard (1330- 1884 m) Exposition préférentielle : indifférente  
Substrat : granites et calschistes (sols acides ou décalcifiés) Topographie : replats et bas de versants

ORGANISATION SPATIALE

Nombre d'unités recensées : Total : 69 fréquence : ++ répartition : ++ dispersion : +

Surface totale: 35, 09 ha (0,75 % du site) surface moyenne de l'habitat : 0,56 ha

Milieux fréquemment associés à cet habitat : landes à genévrier, ruisseaux, zones humides, pâtures mésophiles, pelouses calcicoles du Mesobromion

Principales localités: Plateaux du Clot et du Cayan, Cambasque rive droite, pied du Maleshores

INTERET ET VALEUR PATRIMONIALE DE L'HABITAT SUR LE SITE

Valeur d'usage : Valeur pastorale : moyenne à forte, selon l'abondance en espèces fourragères graminéennes (Agrostide vulgaire, Fétuque rouge) et légumineuses (trèfles et lotiers). A l'inverse, la valeur fourragère de ces pelouses diminue à mesure que s'accroît la proportion en Nard raide

**Remarque** : Ces milieux constituent les pâtures les plus riches du site .

Utilisation pastorale : forte : 40 % des unités, moyenne : 22 %, faible : 20 %, nulle : 18 %

Ces pelouses sont majoritairement bien pâturées sur le site

Espèces patrimoniales liées à l'habitat : richesse en insectes (Lépidoptères, Orthoptères)

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

Etat de conservation : bon : 38 (56%) moyen : 28 (40 %) mauvais : 3 (4 %)

Principales menaces : dynamiques végétales : colonisation par le genévrier, la callune, la myrtille ou le rohodendron, voire implantation de pins. Certaines unités sont colonisées par des graminées sociales (Brachypode, Gispét, ou extension du Nard)


Fréquentation : Localement (Cayan), l'importante fréquentation des bovins et des promeneurs conduit à un pâturage important et à une augmentation des apports nutritifs, ce qui peut induire la modification l'appauvrissement du cortège végétal.

Cet habitat est en moins bon état de conservation général que les autres milieux de pelouses, et le sens d'évolution des unités est également plus négatif, bien que la majorité des unités recensées paraissent stables.

L'analyse contrastée concernant cet habitat illustre la situation des pâtures de plateaux et de bas de versant du site :

- **Concentration** des troupeaux sur les zones de plateaux très accessibles influence directement l'évolution du cortège floristique des pelouses.
- Les prélèvements par les troupeaux, leur répartition hétérogène et les modalités de gestion de ces pâtures ne permettent pas de limiter la **progression des ligneux** là où celle-ci a été initiée, du fait de la déprise.

#### DYNAMIQUE, SUCCESSIONS ET TENDANCES EVOLUTIVES DE L'HABITAT SUR LE SITE



#### OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L'HABITAT SUR LE SITE

La plupart de ces milieux sur le site étant riches en espèces, et donc d'intérêt communautaire **prioritaire**, il convient à moyen terme de maintenir la richesse et la diversité en espèces de ces pelouses.

Maintenir leur valeur pastorale, en garantissant une exploitation équilibrée de ces communautés sur le site (étroitement lié à l'objectif précédent)

Limitier la sur-exploitation et la surfréquentation dans certains secteurs (Clot, Cayan)

Limitier l'extension des ligneux

#### ORIENTATIONS ET PRECONISATIONS DE SUIVI ET DE GESTION CONCERNANT CET HABITAT

**Suivi** : de l'évolution de la richesse spécifique des pelouses en relation avec les modalités et les variations de leur utilisation pastorale.

De la progression des landes à Rhododendron et de la Callune (Cambasque), et des fourrés à genévrier (Clot)

**Gestion** : maintien ou retour d'une pression pastorale suffisante (notamment bovine) pour maintenir l'intégrité de la structure et de la nature de cet habitat. Le maintien d'une pression pastorale modérée et régulière garantit un bon état de conservation de cet habitat sur le site.

> Appliquer un chargement soutenu sur les zones soumises à embroussaillage.

> Favoriser la reprise, voire entreprendre une intervention sur certaines pâtures menacées, en garantissant leur réutilisation par les troupeaux

Limitation de la pression pastorale bovine sur les zones identifiées comme vulnérables (plateaux du Clot et du Cayan) aux processus d'enrichissement en éléments nutritifs (eutrophisation).

***Fiches Actions du DOCOB concernant cet habitat : P4, P5, P6, P7, T2, H3, H4***