

DESCRIPTION

Landine rase à arbrisseaux nains dominées par *Dryas octopetala*, souvent riche en espèces, établie des sols calcaires superficiels de croupes. Les communautés formant ce types de landes sont sciophile et chionophile. Elles peuvent former des îlots

Alliance : *Dryado octopetalae-Salicion pyrenaicae*

BORGEL J. – *Dryas octopetala***PHYSIONOMIE**

	Roche	Sol nu	Herbacées	Ligneux bas
Moyenne	43 %	2 %	51 %	4 %

BILAN DES 4 RELEVÉS

<i>Dryas octopetala</i>	<i>Geranium cinereum</i>
<i>Salix reticulata</i>	<i>Helictotrichon sedenense</i>
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	<i>Lotus alpinus</i>
<i>Saxifraga paniculata</i>	<i>Sesleria caerulea</i>
<i>Gentiana verna</i>	<i>Silene acaulis</i>
<i>Polygonum viviparum</i>	<i>Rhododendron ferrugineum</i>
<i>Alchemilla plicatula</i>	<i>Salix pyrenaica</i>
<i>Carex curvula</i>	

ORGANISATION SPATIALE

Nombre d'unités rencontrées : 9

Surface moyenne des unités : 1,2 ha

Surface relative : 0,2 % de la surface du site

Principales localités : Pic Rond, Pourteillou, Soum Blanc, Male

- ◆ Habitat unique : 22 % des cas
- ◆ Mélange avec des falaises : 56 % des cas

Présence très localisée dans les trois principales vallées du site : Ossoue, Aspé, Bué

CONDITIONS STATIONNELLES**Altitude**


Moyenne : 2223 m Ecart type : 125

Pente préférentielle

51-275 %

Exposition préférentielle

Nord

**VALEURS D'USAGE**

Usage pastoral Dans 55 % des cas, ces landines ne sont pas utilisées par les troupeaux. Lorsqu'elles le sont, leur usage reste toujours faible

Valeur pastorale de l'habitat

Faible à médiocre : VP < 5
Ces landines ne sont utilisées que par les ovins.

INTERET PATRIMONIAL

Geranium cendré
(*Geranium cinereum*)
Espèce vulnérable du Livre Rouge Français



Champignons de l'étage alpin dont certains sont endémiques ou très rares liés aux espèces végétales sous-ligneuses ectomycorhizogènes (Saules alpins, Dryade, Renouée vivipare...)


ETAT DE CONSERVATION

Les 9 unités de tapis à Dryade sont en bon état.

- ◆ 6 unités contiennent des ligneux bas, et cette présence a été interprétée comme une menace potentielle dans 5 cas.
- ◆ L'érosion a été notée comme un facteur pouvant affecter l'évolution de 2 unités

DYNAMIQUE

Considérée comme une formation pionnière, la landine à Dryade est liée à des conditions stationnelles très marquées qui concourent fortement à sa stabilité. Les probabilités d'évolution vers une pelouse mésophile calcaire ou vers un boisement sont de ce fait assez faibles à moyen terme.



ENJEU ET OBJECTIFS

Enjeu :

FORT

Objectifs :

Conserver ces landes ouvertes en évitant leur colonisation par les ligneux ou leur dégradation par le sur-pâturage

PRECONISATIONS D' ACTIONS

Actions de gestion :

Exploitation régulière par le pâturage

Actions de suivi :

Suivi photographique des landes en voie de colonisation