

**DESCRIPTION**

Pelouse acidiphile humide de versant dont la présence est liée à l'écoulement de l'eau de pente, assurant la transition entre les communautés de combe à neige et les pelouses siliceuses qu'elles ceinturent, depuis l'étage subalpin jusqu'à la base de l'étage alpin.

Ces pelouses de dépressions tardivement déneigées sont chionophiles.

Alliance : *Nardion strictae*

**PHYSIONOMIE**

	Roche	Sol nu	Herbacées	Mousses
Moyenne	19 %	7 %	73 %	3 %

Pelouse peu dense, souvent rocailleuse et à recouvrement faible comportant beaucoup de plages de sol nu



MARTIN D. – Pelouse à Vulpin de Gérard

**BILAN DES 7 RELEVÉS**

*Alopecurus alpinus*

*Plantago alpina*

*Androsace carnea*

*Sibbaldia procumbens*

*Galium pyrenaicum*

*Omalotheca supina*

*Festuca eskia*

*Leontodon pyrenaicus*

*Leucanthemopsis alpina*

*Poa alpina*

*Alchemilla plicatula*

*Cerastium alpinum*

*Nardus stricta*

*Armeria alpina*

*Festuca glacialis*

*Carex pyrenaica*

*Gentiana alpina*

*Geranium cinereum*

*Murbeckiella pinnatifida*

*Veronica fruticulosa*

*Galium cespitosum*

*Geum montanum*

*Oreochloa disticha*

*Trifolium alpinum*

*Saxifraga praetermissa*

*Trifolium thalii*

**CONDITIONS STATIONNELLES****Altitude**


Moyenne : 2386 m Ecart type : 109

**Pente préférentielle**

1 à 50 %

**Exposition préférentielle**

Est

**INTERET PATRIMONIAL**

Inconnu

**ORGANISATION SPATIALE**

Nombre d'unités rencontrées : 30

Surface moyenne des unités : 0,9 ha

Surface relative : 0,4 % de la surface du site

Principales localités : Fond d'Aspé, de Sausse, de La Canau, Male

Habitat uniques : 30 % des cas

Mélange avec des combes à neige : 58 %

Mélange avec des éboulis : 16 %

Répartition large dans les zones favorables des vallées d'Ossoue et d'Aspé, plus limitée à Cestrède - Bué

**VALEUR D'USAGE****Usage pastoral**

Les pelouses à Vulpin sont bien utilisées sur le site. Leur usage est qualifié de :

- ◆ Fort : 27 % des cas
- ◆ Moyen : 23 % des cas
- ◆ Faible : 30 % des cas

20 % de ces pelouses ne sont pas utilisées.

**Valeur pastorale de l'habitat**

Elle est moyenne à bonne, mais diminue quand la part du Nard raide s'accroît. Les brebis les exploitent essentiellement pour la fraîcheur régnant dans ces milieux

## ÉTAT DE CONSERVATION


Bon	Moyen
77 %	23 %

L'état de conservation de ces pelouses est sensiblement équivalent à celui de l'ensemble des pelouses du site.

Les menaces sont de deux types :

- ♦ La colonisation par des herbacées : présence d'herbacées à tendance colonisatrice non abrouties
- ♦ Le sur-pâturage : altération du sol visible par des plages de sol nu

## DYNAMIQUE



## OBJECTIFS ET ENJEU

Enjeu :

TRES FORT

Objectifs :

Mieux contrôler la présence des troupeaux dans le but de :

- ♦ Limiter le sur - pâturage dans les zones très fréquentées par le bétail
- ♦ Réduire l'extension du Nard raide qui peut se développer au détriment des autres espèces de la pelouse

## PRECONISATIONS D' ACTIONS

Actions de gestion :

Réaliser un plan de gestion pastoral intégrant ces zones pour :

- ♦ Eviter un pacage trop précoce lors du déneigement, tardif, de ce type de pelouse
- ♦ Eviter le stationnement trop long des troupeaux sur ces pelouses
- ♦ Maintenir un pâturage ovin extensif

Fiches action correspondantes : P2, P5, P6