

## Landes sub-montagnardes à Genêts et Callunes

CB : 31.22	LANDES SECHES EUROPEENNES ANNEXE I (DIRECTIVE HABITATS)
UE : 4030	

### STATUT

Habitat d'intérêt communautaire

### LOCALISATION SUR LE SITE

Sur l'ensemble du site, aux étages inférieurs de préférence.

### SUPERFICIE ET OCCURRENCE

**Surface totale : 60, 19ha**

**Superficie moyenne : 2, ha**

**Nombre d'unité : 97**

Habitat unique : 89

Mosaïque : 0

Mélange : 8

### CONDITIONS STATIONNELLES

**Altitude :** 1400m. – 2500m.

**Exposition préférentielle :** sud

**Substrat :** généralement sur substrat siliceux et sol acide

**Topographie :** Variable, généralement sur des secteurs un peu pentus, qui sont les premiers à être délaissés par le bétail.

### DESCRIPTION DE L'HABITAT

Formations des étages inférieurs et montagnards ne dépassant pas 1600 m d'altitude. Formations dominées par les ligneux bas et principalement la callune. Ces milieux participent à la dynamique pastorale. Ils progressent en période de déprise et sont cantonnés aux secteurs escarpés et inaccessibles lorsque la pression s'accroît. A cette altitude, c'est l'exposition qui est le facteur déterminant de la répartition de ces landes.

Le passage répété du feu peut se traduire par un faciès dominé par l'Asphodèle blanc

### ESPECES CARACTERISANT CET HABITAT

<i>Vaccinium myrtillus</i>	<i>Lycopodium clavatum</i>
<i>Calluna vulgaris</i>	<i>Senecio adonidifolius</i>
<i>Teucrium scorodonia</i>	

### DECLINAISON PHYTOSOCIOLOGIQUE

*Calluno vulgaris - Genistion pilosae*



Lande subatlantique – photo PNP – N. Lagarrigue

### DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

**Etat de conservation :** Bon

#### Sens d'évolution :

L'évolution est directement liée à l'importance du pâturage et à l'intensité de la pression pastorale. Un sous pâturage persistant ou un abandon des pratiques peut accélérer le vieillissement de la lande qui se traduit par l'apparition et le développement de ligneux hauts (houx, noisetiers par exemple). Cette colonisation, si elle se poursuit, ôte tout intérêt pastoral à ces zones.

### VALEUR D'USAGE

**Valeur pastorale :** La **Callune**, contrairement à d'autres ligneux bas, peut être pâturée principalement par les bovins, surtout à l'automne quand elle est en fleur. La valeur pastorale des landes est directement liée à leur âge. Les landes les plus jeunes ayant une appétence plus grande.

### ESPECES PATRIMONIALES LIEES A CET HABITAT

Du point de vue de la flore, les zones de landes sont généralement pauvres et n'abritent que peu d'éléments remarquables.

Au niveau faunistique, ces landes sont des milieux de prédilection de la **Perdrix grise** (*Perdix perdix*) et abritent de nombreuses espèces d'insectes dont les **Orthoptères**, les **Lépidoptères** et les **Hyménoptères** (les landes à Ericacées constituent un secteur important de butinage pour les abeilles)

SITE NATURA 2000 "PIC LONG, CAMPBIE LH" (FR7300928) PROPOSE AU TITRE DE LA DIRECTIVE "HABITATS"  
31.22 (Code UE 4030) : Landes sub-montagnardes à Genêts et à Callunes  
LOCALISATION ET ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS

