

Mésobromion des Pyrénées occidentales

H07

34-322J, 34-323J

PELOUSES CALCICOLES MESOPHILES DES PYRENEES

Annexe I D.H

6210

Communautaire

Occurrence

1 unité en habitat unique, 3 en dynamique.

Localisation sur le site

Sur le flanc ouest de la Piquette.

Statut foncier

Territoire de la Commission Syndicale de la vallée de Barèges

Superficie des entités cartographiées

surface totale : 15 ha.



© Photo : P.MAURY / ONF 65 - 2004

Etat de l'habitat

☺ moyen

Description de l'habitat

L'habitat est située à une altitude comprise entre 1560 et 1900 m, sur la moitié inférieure du versant à l'ouest de la crête Piquette-Coucut avec une pente de 6 à 45°.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Anthyllide vulnérable (*Anthyllis vulneraria*), germandrée des Pyrénées (*Teucrium pyrenaicum*), œillet de Montpellier (*Dianthus monspessulanus*).

Déclinaison phytosociologique

Pelouses calcicoles atlantiques du Pays basque et des Pyrénées occidentales de l'alliance du *Mésobromion erecti*.

Habitats en relation dynamique

Les habitats en dynamique sur le site sont essentiellement les landes à Rhododendron, à genévrier nain, et à Callune (code Natura 2000 : 4060). L'expression de cette dynamique est rendue possible par la déprise de la gestion pastorale.

Espèces remarquables abritées

Géranium cendré (*Geranium cinereum*)

Indicateurs de qualification de l'état de l'habitat

- ☆ Typicité : bonne
- ☆ Dynamique : avancée
- ☆ Dégradation : nulle
- ☆ Organisation spatiale : habitat peu représenté, très localisé sur une seule zone.

APPROCHE PASTORALE

- Valeur pastorale : limitée, de 10 à 20, pelouse favorable au pâturage ovin quand peu de brachypode, ce dernier n'étant consommé qu'en début de saison

Pratiques actuelles déterminantes

- Le pastoralisme prévient la fermeture de cet habitat.

Objectifs et Actions

- ➔ Fiche action P2 et HN2