



## Fourrés à *Juniperus communis subsp. nana*

CB : 31.431

UE : 4060

LANDES ALPINES ET BOREALES

ANNEXE I (DIRECTIVE HABITATS)

### STATUT

Habitat d'intérêt communautaire

### LOCALISATION SUR LE SITE

Essentiellement sur le versant Sud-est aux altitudes moyennes. Quelques zones éparses sur **Auseilla** et **La Lie**

### SUPERFICIE ET OCCURENCE

**Surface totale :** 22,01 ha (0,74 % du site)

**Superficie moyenne :** 2,2 ha (min 0,2 – max 8,4)

**Nombre d'unité :** 10 unités

Habitat unique : 2

Mosaïque : 4

Mélange : 4

### CONDITIONS STATIONNELLES

**Altitude :** 1 890 m (1 550 – 2 250 m)

**Exposition préférentielle :** indifférente

**Substrat :** Siliceux ou calcaire

**Topographie :** indifférente, milieux majoritairement associés aux blocs erratiques et aux chicots rocheux.

### DESCRIPTION DE L'HABITAT

Formation de lande dominée par les arbrisseaux sempervirents xérophile et en particulier les formes prostrées de genévrier. Ces formations sont souvent associées à des milieux pentus plus ou moins rocailloux caractérisés par une sécheresse estivale marquée.

### ESPECES CARACTERISANT CET HABITAT

<i>Juniperus sibirica</i>	<i>Stellaria holostea</i>
<i>Calluna vulgaris</i>	<i>Saxifraga pniculata</i>
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	<i>Hepatica nobilis</i>
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	<i>Sempervivum montanum</i>
<i>Vicia pyrenaica</i>	
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	
<i>Hieracium pilosella</i>	

### DECLINAISON PHYTOSOCIOLOGIQUE

*Loiseleurio procumbentis* – *Vaccinietea microphylli*

-*Rhododendro ferruginei* – *Vaccinietalia microphylli*

***Juniperion nanae***

### DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

**Etat de conservation :** Bon (80%)

**Sens d'évolution :** Stable (60%)


La croissance du Genévrier est particulièrement lente, elle génère des milieux stables en apparence, inscrits dans une faible dynamique. A terme, le pin à crochet peut s'installer et piquer les landes. Dans les conditions les plus favorables au développement forestier, une pineraie peut progressivement apparaître. Les landes associées à des milieux rocheux ou à des blocs semblent à l'abri de cette évolution.

### VALEUR D'USAGE



**Valeur pastorale :** La lande à Genévrier nain possède un potentiel fourrager directement lié au degré de fermeture. Jusqu'au 50 % de recouvrement, ces milieux peuvent être parcourus par les troupeaux qui trouvent entre les ligneux une ressource exploitable. Au-delà de ce niveau de recouvrement la lande devient impénétrable pour le bétail et son intérêt pastoral devient très faible à nul, du fait de la très faible productivité de la strate herbacée.


### ESPECES PATRIMONIALES LIEES A CET HABITAT

Seules les landes les moins denses (jusqu'à 70 % de recouvrement) présentent un intérêt comme habitat d'espèces pour certains oiseaux comme la Perdrix (*Perdix perdix*) ou encore le Grand Tétrás (*Tetrao urogallus*)






Légende

-  Réseau hydrographique (Hors site)
-  Route
-  Pic
-  Village
-  Lac (Hors site)
-  Limite du site

 Unité d'habitat délimitée sur le terrain

Etat de conservation

-  Bon
-  Moyen
-  Mauvais

Lac de Migouélou

1 kilomètre