

H9

Pelouses calcicoles mésophiles des Pyrénées (*Mesobromion*) – 34-323J

FORMATIONS HERBEUSES SECHES SEMI-NATURELLES SUR CALCAIRES - 6212

 HABITATS AGROPASTORAUX
~ PELOUSES~

Annexe I D.H – Habitat d'intérêt communautaire

Occurrence

97 unités dont 7 en habitats élémentaires et 5 sur falaises ou éboulis calcaires, le reste au sein de complexes avec des habitats de landes, de fourrés et de fruticées.

Localisation sur le site

Sauguet, la Pâle, les Pernes, la Toue, versant Sud du Pibeste, versant Sud du Col d'Andorre,...

Statut foncier / Statut de protection

Territoires communaux, domaniaux indivis relevant ou non du régime forestier, inclus ou non dans la Réserve Naturelle volontaire du Pibeste.

Superficie des entités cartographiées

Surface totale en habitats élémentaires (+ unités sur milieux rocheux) : 220 ha soit 3% du site.

Surface totale en complexes : 900 ha (12% du site)

Description de l'habitat

Pelouses calcicoles mésophiles présentes sur le site de l'étagé collinéen à montagnard inférieur (1400 m d'altitude) sur des pentes faibles à fortes, des sols peu épais et généralement sur des versants chauds.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Le *Mesobromion* pyrénéen est dominé par une graminée : le Brachypode. Il est accompagné d'autres graminées comme la Séslerie bleue *Sesleria albicans*, la Koelérie pyramidale *Koeleria pyramidata* et d'espèces thermophiles montagnardes colorées l'Oeillet de Montpellier *Dianthus monspessulanus* et le Panicaut de Bourgat *Eryngium bourgati*.

Particularité : une unité en versant Sud du Pibeste est à la belle saison « blanche » de Séséli *Seseli libanotis*.

Déclinaison phytosociologique

Pelouses mésoxérophiles, collinéennes à montagnardes

Festuco – Brometea

Festuco- Brometalia

Communautés atlantiques du secteur cantabrique

Potentillo – Brachypodium rupestris

Habitats en relation dynamique


Ces pelouses se voient colonisées par des **Fruticées à Genévrier commun** et **Genévrier sabine** ou des landes pré forestières à **Genêt occidental**. Les faciès d'embroussaillage par les fougères s'observent en nombre sur le site.

Pratiques actuelles déterminantes

↗ Le Pâturage extensif et ↗ le Brûlage dirigé permettent de maintenir ces milieux ouverts

↘ L'utilisation d'antiparasitaires. Cf. remarque valant pour tous les faciès pastoraux.

➔ Randonnée pédestre, ➔ Escalade



© Photos : I.BASSI / ONF 65 - 2003

Etat de l'habitat

☺ Bon à ☺ Moyen

Indicateurs de qualification de l'état de l'habitat

- ☆ Typicité : Bonne
- ☆ Dynamique : Avancée pour les unités en mélange avec des landes à fougère
- ☆ Dégradation : Ponctuelle
- ☆ Organisation spatiale : Habitat bien représenté sur le site mais le plus souvent couvert par des fougères ou des ligneux bas.

APPROCHE PASTORALE

- Type pastoral : pelouses à Brachypode et Fétuque rouge ou à Brachypode et Héliantheme
- Valeur pastorale médiocre à moyenne (VP = 10 à 20). Formations précoces et productives mais peu attractives pour les ovins qui délaissent le Brachypode. Elles sont mieux pâturées par les bovins et surtout par les chevaux. Les versants à Brachypode sont généralement entretenus par des feux pastoraux réguliers, voire annuels sur certains secteurs, qui permettent d'éliminer l'abondante litière accumulée en fin de saison. Cette pratique permet en outre d'éviter l'installation de ligneux bas. Elle ne fait toutefois que renforcer la dominance du Brachypode.

Espèces remarquables abritées

Zone de nourrissage des oiseaux car l'habitat est favorable aux insectes entre autres.

➔ OBJECTIFS ET ACTIONS

- ➔ **Fiche ACTION** Gestion Estive 0 à 5
Suivi Estive 6