

**PELOUSES ATLANTIQUES A AGROSTIS ET FETUQUES – 35-12\***

**FORMATIONS HERBEUSES A NARD, RICHES EN ESPECES,  
ET GROUPEMENTS APPARENTES - 6230**

*Annexe I D.H – Habitat d'intérêt prioritaire*

HABITATS AGROPASTORAUX  
~ PELOUSES~

**H11**

**Occurrence**

46 unités dont 26 en habitats élémentaires, 3 en mosaïques et le reste en dynamique avec des habitats de landes et de fruticées.

**Localisation sur le site**

Principalement dans les quartiers de Bat de Hau, Aulhet, plateau de l'Isarce puis à l'Ouest quartier Peyhorgue. Quelques unités vers le Prat dou Rey et le Pibeste.

**Statut foncier / Statut de protection**

Territoires communaux ou domaniaux indivis relevant du régime forestier ou non, inclus dans la Réserve naturelle volontaire du Pibeste ou non.

**Superficie des entités cartographiées**

Surface totale en habitats élémentaires : 207 ha

Surface totale en complexes : 115 ha

→ L'ensemble représente près de 4% du site



© Photos : I.BASSI / ONF 65 - 2003

**Etat de l'habitat**

☺ Bon à ☹ Moyen

**Description de l'habitat**

Pelouses mésophiles fermées, rases, parcourues par les troupeaux sans être surpâturées comme leur aspect le laisse souvent supposer. Elles sont présentes sur le site sur des replats ou bien des dépressions de 1100 à 1800 m d'altitude.

**Espèces "indicatrices" de l'habitat**

Ce type de pelouses abrite en abondance plusieurs espèces d'Agrostides et de Fétuques dont *Agrostis capillaris* et *Festuca ovina* et *F. rubra*. Le caractère atlantique est indiqué par la présence de la Wahlenbergie à feuilles de lierre *Wahlenbergia hederacea*.

**Déclinaison phytosociologique**

Pelouses oligotrophes, acidiphiles, montagnardes atlantiques à subatlantiques

*Nardetea strictae / Nardetalia strictae*

Communautés acidiclinales sub - nord - atlantiques

*Violin caninae*

**Habitats en relation dynamique**

Certaines de ces formations sont partiellement envahies par des **fruticées à Genévrier commun** ou encore par la Fougère aigle dans les zones plus basses. D'autres secteurs abandonnés par la pâture ont évolué en **landes à Ericacées**. Le quartier de Bat de Hau présente un faciès à Cirse laineux *Cirsium eriophorum* caractéristique des zones de couchage où se concentrent les troupeaux aux heures de repos. Cette espèce peut devenir à terme gênante pour les ovins qui tendront à éviter les zones peu à peu « salies ».

**Espèces remarquables abritées**

Milieu ouvert représentant une zone de nourrissage des oiseaux, insectes coprophages sur les bouses,...

**Indicateurs de qualification de l'état de l'habitat**

- ☆ Typicité : Bonne
- ☆ Dynamique : Non apparente à très avancée
- ☆ Dégradation : Nulle à généralisée
- ☆ Organisation spatiale : Habitat très bien représenté sur le site

**APPROCHE PASTORALE**

- Types pastoraux : Pelouses productives à Fétuque rouge et Pâturins ou à Fétuque rouge et Agrostide, pelouses thermophiles à Fétuque rouge
- Très bonne valeur pastorale (VP = 20 à 50). Formations précoces, productives et très attractives pour les troupeaux, ces pelouses abritent notamment diverses espèces de Trèfles. On les trouve à proximité des cabanes et des zones de repos. Elles sont indicatrices d'une pression de pâturage élevée et d'une fertilisation spontanée du milieu liée à la fréquentation des animaux.

**Pratiques actuelles déterminantes**

- Le Pâturage extensif ovin et bovin sur l'ensemble du site et équin dans le secteur de l'Estrém de Salles et ➤ Brûlage dirigé

**Autres pratiques**

- Randonnée pédestre

**➔ OBJECTIFS ET ACTIONS**

- ➔ Fiche ACTION Gestion Estive 0 à 5  
Suivi Estive 6