

**PRAIRIES HUMIDES A JONC ET A MOLINIE – 37-312****PRAIRIES ACIDIPHILES PARATOURBEUSES A MOLINIE - 6410**

Annexe I D.H – Habitat d'intérêt communautaire

HABITATS AGROPASTORAUX  
~ PRAIRIES~**H14****Occurrence**

1 unité en mosaïque  
Pour mémoire : Identifiant carte (Id) 24.1

**Localisation sur le site**

Autour de la tourbière haute active du lieu-dit « Ech »

**Statut foncier**

Commune d'Omex. Propriétés privées respectives de  
M. PLAGNET et M. BORDERE  
→ Réf. cadastrale parcelles 8a,28 et 5,6, Section C.

**Superficie des entités cartographiées**

Surface totale en mosaïque : 3 ha



Faciès observé dans la parcelle 5

© Photos : O. CALLET / AMIDEV - 2003

**Description de l'habitat**

Prairies humides paratourbeuses à Jonc et Molinie bleue dans lesquelles la tourbe est fortement minéralisée (au moins sur 1,2 m de profondeur). La parcelle 6 présente un faciès beaucoup plus sec, moins typique. En revanche, la formation observée en parcelle 5 est très gorgée d'eau et située en rupture de pente. Elle représente une zone tampon entre les prairies de fauche fertilisées, drainées ou non en amont et la tourbière active au delà du fossé existant.

**Espèces "indicatrices" de l'habitat**

Ces formations sont dominées par le Jonc à feuilles aiguës *Juncus acutiflorus* et la Molinie bleue *Molinia caerulea*. Ces deux espèces sont accompagnées de Potentille (*Potentilla erecta*), de Lotier des tourbières (*Lotus uliginosus*), de Carex et de Graminées.

**Déclinaison phytosociologique**

Prairies hygrophiles sur sols oligotrophes  
*Molinio caeruleae* – *Juncetea acutiflori*  
Communautés non méditerranéennes  
*Molinietalia caeruleae*  
Communautés sur sols paratourbeux  
*Juncion acutiflori*

**Habitats en relation dynamique**

Suite à un assèchement artificiel, par drainage ou brûlis et/ou à l'abandon du pâturage, ces prairies humides peuvent s'enrichir en Molinie aux dépens d'autres espèces et à terme être colonisées par des ligneux (Bouleaux, Saules, ...)

**Espèces remarquables abritées**

Cet habitat est composé d'espèces adaptées aux milieux humides et héberger un papillon : le **Fadet des Laïches** (Cf. Fiche Espèce E12).

**Etat de l'habitat**

☺ Bon à ☹ Moyen

**Indicateurs de qualification de l'état de l'habitat**

- ☆ Typicité : Bonne (parcelle 5) – Moyenne (parcelle 6)  
Mauvaise (parcelles 8a et 28)
- ☆ Dynamique : Non apparente
- ☆ Dégradation : Nulle (parcelle 5,6)- Généralisée (parcelle 8a)
- ☆ Organisation spatiale : Habitat fragmenté, localisé

**APPROCHE PASTORALE**

➤ Valeur fourragère : médiocre

**Remarque**

La fauche régulière sans travail du sol ni semis permet de voir apparaître des espèces adaptées à l'hydromorphie et de valeur fourragère moyenne.

**Pratiques actuelles déterminantes**

- Parcelle 8a,28 : prairie pâturée, drainée, labourée et semée
- Parcelle 5,6 : prairie pâturée, non drainée, non brûlée

**→ OBJECTIFS ET ACTIONS**

- Fiche ACTION *Gestion* Ech 2  
*Suivi* Ech 3