

Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses – *51-11**TOURBIERES HAUTES ACTIVES - 7110**

Annexe I D.H – Habitat d'intérêt prioritaire

H19

Occurrence

1 seule unité en lien étroit avec des zones dégradées à Molinie bleue.

Pour mémoire : Identifiant carte (Id) 23.0

Localisation sur le site

En contre bas du Soum et du Col d'Ech, au lieu dit « Ech ».

Statut foncier

Commune d'Omex. Propriété privée de M. BORDERE. →
Réf. cadastrale parcelle 16 Section C.

Superficie des entités cartographiées

Surface totale de la tourbière : 4 ha (<1% du site)

Description de l'habitat

Située à 750 m d'altitude, cette tourbière est formée de buttes à Sphaignes colorées qui lui donnent en outre un aspect bombé. Ces buttes sont qualifiées d'*ombrotrophes* car essentiellement alimentées par les eaux de pluies et dites *actives* car composées d'une végétation permettant la formation et la croissance de la tourbe qui est dans ce cas épaisse et non minéralisée.

Espèces "indicatrices" de l'habitat

Buttes composées d'une ou de plusieurs espèces de sphaignes *Sphagnum ssp.* et de Bruyère à quatre angles *Erica tetralix*. A noter la présence du Narthécie ossifrage *Narthecium ossifragum* et de la Linaigrette à feuilles étroites *Eriophorum angustifolium* tous deux indicateurs d'une nappe d'eau à faible profondeur.

Déclinaison phytosociologique

Végétation des tourbières acides euro - sibériennes

Oxycocco palustris – *Sphagneteeta magellanici*

Buttes à sphaignes ombrotrophes

Erica tetralix – *Sphagnetalia papillosi*

Oxycocco – *Ericion tetralicis*

Habitats en relation dynamique

Les alentours directs de cet habitat sont asséchés et envahis peu à peu par des Joncs et de la Molinie bleue *Molinia caerulea* (Cf. Fiche H20 de l'habitat **Tourbières dégradées à Molinie bleue**).

L'habitat est parsemé de très faibles surfaces d'un autre habitat d'intérêt communautaire prioritaire, les dépressions ou gouilles à *Rhynchospora alba* (code Corine : 51-122 / Code Natura 2000 : 7110).

Espèces remarquables abritées

Cet habitat renferme diverses espèces de Laïches (*Carex sp.*) et autres espèces adaptées aux milieux humides. Toutes sont susceptibles d'être « plante hôte » d'un papillon : le **Fadet des Laïches** (Cf. Fiche Espèce E12). N'oublions pas qu'un tel habitat peut être déterminant pour certaines espèces de libellules, d'araignées, de reptiles ou encore de fourmis !



© Photos : O.CALLET/AMIDEV et P.MAURY / ONF 65 - 2003

Etat de l'habitat

☺ Moyen

Indicateurs de qualification de l'état de l'habitat

- ☆ Typicité : Bonne
- ☆ Dynamique : Avancée
- ☆ Dégradation : Ponctuelle (pourtour)
- ☆ Organisation spatiale : Habitat non fragmenté, peu représenté sur le site, de très faible surface.

APPROCHE PASTORALE

➤ Valeur pastorale : médiocre ; 5<VP<10

Ressource potentiellement intéressante en fin d'été. Risque de colonisation assez rapide par des ligneux hauts (buissons, arbustes) en l'absence de toute intervention

Pratiques actuelles déterminantes

L'habitat est très sensible à toute perturbation de son fonctionnement hydrologique, par conséquent :

- Elimination des ligneux et des refus par l'usage du feu
- Restauration et entretien de fossés et de multiples drains
- Pâturage bovin extensif (~25 têtes) en début et fin de saison.

→ OBJECTIFS ET ACTIONS

→ **Fiche ACTION** Gestion Ech 1
Suivi Ech 3