


Légende

▲	Pic	Etat de conservation	
■	Village	■	Bon
□	Limite du site	■	Moyen
□	Unité cartographiée sur le terrain	■	Mauvais

DYNAMIQUE, SUCCESSIONS ET TENDANCES EVOLUTIVES DE L'HABITAT SUR LE SITE



OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L'HABITAT SUR LE SITE

La diversité en espèces de cet habitat sur le site est variable, et n'a pu être évaluée de façon systématique. Cet habitat étant potentiellement d'intérêt communautaire **prioritaire**, il convient à moyen terme de maintenir la richesse et la diversité en espèces de ces pelouses.

Maintenir leur valeur pastorale, en garantissant une exploitation équilibrée de ces communautés sur le site (étroitement lié à l'objectif précédent) par le pâturage ovin particulièrement

Limiter l'extension des ligneux (Affron, Arratille, la Huchole/Pouey-Trénous).

Limiter l'expansion appauvrissante du Gispet sur les nardaies (Arratille, Estom, Pouey-trénousPe-det-Mailh)

ORIENTATIONS ET PRECONISATIONS DE SUIVI ET DE GESTION CONCERNANT CET HABITAT

Suivi : des dynamiques liées aux pratiques pastorales sur ces milieux :

- colonisation par les ligneux bas
- implantation et extension du Gispet

Gestion : maintien ou retour d'une pression pastorale modérée et suffisante pour maintenir l'intégrité de l'ouverture et de la diversité floristique des nardaies subalpines. Le maintien d'une pression pastorale modérée et régulière garantit un bon état de conservation de cet habitat sur le site.

> Appliquer un chargement soutenu sur les zones soumises à embroussaillage.

> Favoriser la reprise, voire entreprendre une intervention sur certaines pâtures menacées, en garantissant leur réutilisation par les troupeaux

Fiches Actions du DOCOB concernant cet habitat : P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, H4

***36.31: Gazons à Nard raide et communautés apparentées**

Nardion

Statut : intérêt communautaire prioritaire – 6230
- si riche en espèces -



LE MOAL T...- Cuyéou Bielh

ESPECES CARACTERISANT LOCALEMENT CET HABITAT

<i>Nardus stricta</i>	<i>Plantago alpina</i>
<i>Festuca rubra</i>	<i>Poa alpina</i>
<i>Festuca eskia</i>	<i>Leontodon pyrenaicus</i>
<i>Antennaria dioica</i>	<i>Carex sempervirens</i>
<i>Festuca nigrescens</i>	<i>Jasione laevis</i>
<i>Trifolium alpinum</i>	<i>Campanula scheuchzeri</i>

DESCRIPTION

Pelouses acidiphiles rases subalpines et alpines, dominées par le Nard. Ces milieux correspondent à des faciès très différents sur le site, et ont été rattachés à ce code CORINE du fait de leur faible différenciation.

CONDITIONS STATIONNELLES

<i>Altitude :</i> 1800 – 2650 m (du subalpin à l'alpin)	<i>Expositions :</i> toutes
<i>Substrat :</i> granite et calcschistes (substrat acide ou décalcifié)	<i>Pentes :</i> replats et pentes douces

ORGANISATION SPATIALE

Nombre d'unités recensées : **Total : 204** fréquence : +++ répartition : +++ dispersion : ++

Surface totale : 156,47 ha (2,13 % du site)

Milieux fréquemment associés à cet habitat : ruisseaux et zones humides, affleurements granitiques, landes à Genévrier, à Callune ou à Rhododendron, autres pelouses du *Nardion*, pelouses en gradins à *Festuca eskia*

Principales localités : sur l'ensemble de la zone granitique et schisteuse subalpine du site : Marcadau, Arratille, Oulettes d'Ossoue, lacs du Montferrat, Estom Soubiran, Estibe Aute, Pouey-Trénous, la Huchole, etc.

INTERET ET VALEUR PATRIMONIALE DE L'HABITAT SUR LE SITE

Valeur d'usage : *Valeur pastorale :* pouvant être faible à moyenne, elle varie selon l'abondance des fourragères telles que le Trèfle alpin, la Fétuque rouge et l'Agrostide vulgaire. Elle est cependant le plus souvent médiocre, le Nard raide et le Gispet, qui constituent des refus, étant parfois très dominants.

Ces pelouses sont pâturées de manière très hétérogène sur le site, selon leur localisation dans les parcours

Espèces patrimoniales liées à l'habitat : certains faciès sont riches en espèces d'insectes (Lépidoptères, Orthoptères)

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

Etat de conservation : bon : 177 (87,2 %) moyen : 18 (9 %) mauvais : 4 (2 %) ? : 4 (2 %)
Sens d'évolution : stable : 158 (77,5 %) pos. : 7 (3 %) nég. : 26 (12,7 %) pos-nég. : 3 (1 %) ? : 10 (5 %)

Principales menaces : dynamiques végétales : colonisation par les ligneux bas (rhododendron et callune surtout, genévrier, myrtille) constituent près de 70% des menaces constatées, sur des pelouses de versants (Pouey-Ténous, la Huchole, Arratille/Affron, Oulettes) : risque réel pour plus de 20% des unités. Les pins ne progressent que très localement.

L'appauvrissement floristique dû à la progression du Gispet concerne 10 % des unités de l'habitat sur le site (Arratille, ...)

Fréquentation : localement (Marcadau), des phénomènes liés à l'importante fréquentation par les promeneurs et /ou le bétail (érosion, piétinement) ont été constatés (2 % des unités concernées)

Cet habitat est en **bon état** de conservation, meilleur que plusieurs autres milieux de pelouses du site, et **plutôt stable**, malgré des dynamiques naturelles importantes de fermeture par la lande, localement très importantes, dues à la déprise pastorale sur de nombreuses estives à Ovins (la Huchole/ Pouey-Trénous, l'Affron).