



**54.28 : Bas-marais à *Carex frigida***

*Caricetum frigidae* (*Tofieldio-caricetum frigidae*,  
*Cariceto frigidae-Pinguiculetum grandiflorae*.)

**Statut** : intérêt communautaire - 7230



MARTIN D. - Pouey-Mourou

**ESPECES CARACTERISANT LOCALEMENT CET HABITAT**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <i>Carex frigida</i>       | <i>Pinguicula grandiflora</i> |
| <i>Carex panicea</i>       | <i>Tofieldia calyculata</i>   |
| <i>Primula farinosa</i>    | <i>Carex gr. flava</i>        |
| <i>Parnassia palustris</i> |                               |

**DESCRIPTION**

Formations dominées par *Carex frigida*, qui forme des communautés denses, souvent peu riches en espèces, sur de petites surfaces le long de suintements et de ruissellements d'eaux à tendance alcaline.

**CONDITIONS STATIONNELLES**

*Altitude* : principalement à l'étage subalpin, mais aussi au montagnard (1800-2440m)

*Substrat* : granites alcalins, calschistes

*Topographie* : mi-versant, bords de ruisseaux et de ruisselets

**ORGANISATION SPATIALE**

Nombre d'unités recensées : **Total : 108** *fréquence* : +++ *répartition* : ++ *dispersion* : ++

*Milieus fréquemment associés à cet habitat* : ruisselets et sources alcalines, tourbières basses à *Carex davalliana*, bas-marais à *Carex davalliana* et *Trichophorum cespitosum*, trichophoraies

*Principales localités*: Port du Marcadau, Loubosso, Arratille, Haute vallée d'Ossoue (Pouey-Mourou, lacs du Montferrat)

**INTERET ET VALEUR PATRIMONIALE DE L'HABITAT SUR LE SITE**

**Valeur d'usage** : *Valeur et utilisation pastorale*: faible (abreuvement des ovins et des bovins)

**Espèces patrimoniales liées à cet habitat** : Crapaud accoucheur (*Alytes obstetricans*), Euprocte (*Euproctus asper*)

**DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE**

*Etat de conservation* : **bon : 101** (94 %) **moyen : 6** (5 %) **mauvais : 1** (1 %)

*Principales menaces constatées* : piétinement très localisé, érosion.

Cet habitat est en **très bon** état de conservation sur le site, et paraît **stable**. Les phénomènes de piétinement et d'érosion constatés sur quelques unités ne semblent pas constituer une menace, au vu du caractère pionnier de l'habitat, et du type de pâturage, ovin.

**DYNAMIQUE, SUCCESSIONS ET TENDANCES EVOLUTIVES DE L'HABITAT SUR LE SITE**

Ces communautés au caractère « pionnier » se développent sous forme de touffes denses sur des zones rocailleuses soumises à un ruissellement d'eaux à tendance alcaline, parfois important.

**OBJECTIFS DE CONSERVATION DE L'HABITAT SUR LE SITE**

Pas d'objectif particulier, outre le maintien des conditions favorables à cet habitat dans sa zone de distribution

**ORIENTATIONS ET PRECONISATIONS DE SUIVI ET DE GESTION CONCERNANT CET HABITAT**

**Suivi** : des processus d'implantation et de réaction de ces habitats aux phénomènes d'érosion et de piétinement, afin de mieux en connaître les modalités et la dynamique

**Gestion** : Aucune mesure de gestion particulière préconisée