



## Pelouses en gradins et en guirlandes

<b>CB : 36.43</b>	<b>PELOUSES CALCAIRES ALPINES ET SUBALPINES</b> ANNEXE I (DIRECTIVE HABITATS)
<b>UE : 6170</b>	

### STATUT

Habitat d'intérêt communautaire

### LOCALISATION SUR LE SITE

Essentiellement sur les marges sud du site dans le secteur de la *Montagne de Camplong*.

### SUPERFICIE ET OCCURRENCE

**Surface totale 52,60 ha**

**Superficie moyenne : 0,89 ha**

**Nombre d'unité : 59**

Habitat unique : 55

Mosaïque : 0

Mélange : 4

### CONDITIONS STATIONNELLES

**Altitude** : 1610m. – 2720m.

**Exposition préférentielle** : sud

**Substrat** : carbonaté ou riche en bases

**Topographie** : versants pentus

### DESCRIPTION DE L'HABITAT

Formations de pelouses ouvertes à très ouvertes caractérisées par une végétation peu dense et de faible hauteur. Pelouse se développant de la frange supérieure de l'étage montagnard jusqu'à la base de l'étage alpin aux expositions chaudes et ensoleillées des versants pentus et rocaillieux sur sol jeune et squelettique.

### ESPECES CARACTERISANT CET HABITAT

<i>Festuca gautieri</i>	<i>Teucrium pyrenaicum</i>
<i>Helianthemum alpestre</i>	<i>Gypsophila repens</i>
<i>Koeleria valesiana</i>	<i>Sideritis hyssopifolia</i>
<i>Paronychia serpyllifolia</i>	<i>Anthyllis montana</i>

### DECLINAISON PHYTOSOCIOLOGIQUE

*Festuco valesiacae* – *Brometea erecti*  
*Ononidetalia striatae*  
***Festucion scopariae***



Photo PNP Catherine Brau-Nogué

### DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

#### Etat de conservation :

#### Sens d'évolution :


A l'étage subalpin, cette formation évolue de manière lente et dans un contexte de déprise pastorale vers une lande à Genévrier ou Raisin d'ours. Le stade forestier correspond à une pineraie de Pins à Crochets calcicole à tendance sèche. Cette évolution est particulièrement lente du fait des caractéristiques pédo-édaphiques de l'habitat qui se développe initialement sur sol squelettique.

### VALEUR D'USAGE

**Valeur pastorale** : Elle est liée au taux de recouvrement de l'habitat qui ne dépasse pratiquement jamais 60 % et à la présence d'un cortège de graminées varié mais de faible valeur fourragère (Fétuque groupe ovine, Sesslerie bleuâtre, Koellerie du Valais) La Fétuque de Gautier est une plante au limbe coriace qui n'est consommée par le bétail qu'en début de saison d'estive.

### ESPECES PATRIMONIALES LIEES A CET HABITAT

Communauté riche en endémiques et subendémiques pyrénéennes (Fétuque de Gautier, Gaillet des Pyrénées...)  
Habitat caractéristique et endémique des paysages pyrénéens de la haute montagne calcaire.



**Légende**

 Limite du site

 Réseau hydrographique (Hors site)

 Route

 Pic

 Village

 Unité d'habitat délimitée sur le terrain

Etat de conservation

 Bon

 Moyen

 Mauvais