

Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses

CB : 51.11	* TOURBIERES HAUTES ACTIVES ANNEXE I (DIRECTIVE HABITATS) PRIORITAIRE
UE : 7110	

STATUT

Habitat prioritaire

LOCALISATION SUR LE SITE

Ensembles localisés de petite taille régulièrement répartis sur le site

SUPERFICIE ET OCCURRENCE

Surface totale : 0, 627 ha

Superficie moyenne : 0, 104 ha

Nombre d'unité : 6

Habitat unique : 6

Mosaïque : 0

Mélange : 0

CONDITIONS STATIONNELLES

Altitude moyenne : 2110m. – 2200m.

Exposition préférentielle : terrains plats

Substrat : acide

Topographie : Terrain plat et petites dépressions



Photo PNP Catherine Brau-Nogué

DESCRIPTION DE L'HABITAT

Végétation de coussins, dômes ou petites buttes composés de sphagnes accompagnés par d'autres mousses et parfois envahies par des ligneux bas (Callune, bruyères...) La décomposition de ces sphagnes dans une atmosphère saturée en eau et privée d'oxygène conduit à la formation de tourbe

ESPECES CARACTERISANT CET HABITAT

Sphagnum sp.

Calluna vulgaris

Carex nigra

Carex panicea

Nardus stricta

Pinguicula vulgaris

Primula farinosa

Potentilla erecta

DECLINAISON PHYTOSOCIOLOGIQUE

Oxycocco palustris-Sphagnetea magellanici

Sphagnion magellanici

Oxycocco-Ericion tetralicis

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

Etat de conservation : Bon tant que les usages notamment pastoraux restent en adéquation avec les potentialités du milieu.

Sens d'évolution : Ces buttes constituent des milieux qui s'édifient en augmentant leur épaisseur. Cette augmentation tend à dissocier la butte de son alimentation hydrique et minérotophe. Le sommet s'assèche et est colonisé par les éricacées dont le développement accentue le phénomène.

VALEUR D'USAGE

Valeur pastorale : La plus part de ces milieux appartiennent à ensembles pastoraux plus vastes et peuvent, même si ils restent peu productifs et faiblement attractifs, être parcourus par les troupeaux.

ESPECES PATRIMONIALES LIEES A CET HABITAT

Les tourbières abritent un grand nombre d'espèces particulières dont certaines sont propres à ces milieux. Parmi les espèces à statut, on peut citer la présence très régulière de la Droséra à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) et du Lézard vivipare (*Zootoca vivipara*)

