

Site Natura 2000

« Moun né de Cauterêts, Pic de Cabaliros »



Comité de suivis et de pilotage
4 juin 2018 – Estaing



ORDRE DU JOUR



Présentation



Communication



Milieux naturels



Pastoralisme



Questions diverses

Changement de la chargée de mission Natura 2000
depuis le 1 mai 2018

Rose-Marie GRENOUILLET → Wendy LESNIAK



❖ Lettre infosite : mars 2017



❖ Lettre infosite 2018

- Focus sur le groupe des chauves-souris : 4 espèces d'IC sur le site (petits / grands Rhinolophes et petits / grands Murins)

- Sensibilisation sur les chauves-souris



- Actions sur le site
 - 1 action terminée
 - 1 action en cours
- Quizz ?
- Suggestions ?

COMMUNICATION

Panneaux de communication


❖ Panneau informatif 1200 x 800 (secteur Catarrabes)

- Sortie terrain à prévoir ?
- Emplacement précis (sur le parking) ?
- Harmonisation avec les autres panneaux
- Contenu du panneau
- Pose et entretien à prévoir ?
- D'autres propositions ?



❖ Panneaux pédagogiques 300 x 500 (ZH de la Badette)


- Trois petits panneaux qui longe le sentier de la ZH
- Forme de pupitre
- Emplacement et contenu ?



COMMUNICATION

Panneaux de communication

❖ Panneau informatif 1200 x 800 (secteur Catarrabes)



14 balades dans la
vallée des Gaves

3000
exemplaires !

Diffusion via les
offices de tourisme

Journée de
sensibilisation des
agents

Numérisation du
livret

Découvrir les Vallées des Gaves autrement « Balades au cœur des sites Natura 2000 »

SITES NATURA 2000 Moun Né de Cauterets Pic de Caballros



WIGAU :
DUREE / DISTANCE : 2h (7 km)
SAISON : été
CARTES IGN : 3543 ET 3544/02
Angèle Gasser - Le Landerin

DÉPART : depuis Arcizans-Avant, prendre la piste pastorale (carré des montants), après le camping « Les châtaigniers » (à l'ouest du village), environ 3/4h de voiture, ou 50h à pied à partir du village

DÉNIVELÉ : 230 m
HAUSSE : en cours (2021)



Zone humide de la Badette

La zone humide couvre environ 5 hectares avec une forme ramifiée composée d'une partie principale assez linéaire de près de 900 m de long, orientée de l'est vers l'ouest. Elle occupe une sorte de dépression sur laquelle viennent se raccorder côté sud plusieurs petits talwegs. La zone humide comprend plusieurs unités qui sont pour certaines assez homogènes et pour d'autres complexes, formant soit des mosaïques de bas-marais, soit des vallons tourbeux entourés de landes humides.

Sur les abords de la tourbière, vous pouvez observer la présence d'espèces comme la Pie-grièche écorcheur, le Grand tetras, le Lézard vivipare et la Grenouille rousse.

Parmi les papillons, le Grand collier argente et le Fadet commun sont présents.

Pie-grièche

Le tour de l'Aussère
De belvédères en zones humides.

Cette balade vous offre différents paysages : tout d'abord ouverts vers la vallée d'Argelès-Gazost sur un chemin parsemé d'orchidées puis plus fermés en traversant un bosquet qui mène aux zones humides de la Badette. Une sente sur la gauche vous permet de les longer jusqu'en haut et retrouver la piste pastorale.

Le premier kilomètre offre de superbes vues sur la vallée des gaves et le Massif du PIBEST en face.

1 A l'ombre des épiciers

Vous traversez ensuite une forêt plantée d'épicéas communs : c'est l'occasion de tendre l'oreille pour reconnaître le chant des oiseaux. Le sentier est également parsemé de différentes espèces d'orchidées.

Vous allez reprendre vers le sud pour longer un petit torrent sans le traverser.

2 Les zones humides

Ce petit kilomètre dans un milieu plus rocheux et broussaillux vous conduit au bas de la zone humide de la Badette.

Vous pouvez observer un complexe de zones humides : les zones de tourbières et de prairies marécageuses, des bas-marais alcalins, des landes humides et les zones de broussailles humides ou tourbeuses plus ou moins fourrées.

3 Une pie aux moeurs frappantes !

Le long de la sente qui vous ramène à la piste pastorale, ouvrez l'œil : vous aurez peut-être la chance de voir la pie grièche « écorcheur » en train de vous observer de son perchoir. Elle chasse essentiellement de gros insectes à l'aût depuis un perchoir dégagé et capture ses proies au sol (coléoptères, orthoptères, lépidoptères, mais aussi de petits vertébrés comme de jeunes campagnols ou de petits lézards). Elle peut poursuivre également de gros insectes au vol (hyménoptères, odonates). Quand les proies abondent, elle a l'habitude de se constituer des réserves : elle empale sur une épine ligneuse ou un fil barbelé les proies non consommées en vue des jours où la nourriture se fait rare.

De retour sur la piste pastorale, vous pouvez faire une halte au niveau de panneau d'information sur Natura 2000. En redescendant, profitez des paysages et des aires d'emvol des vautours ou... des parapentes !

24


Linoglytus

25

COMMUNICATION

Film de promotion

- ❖ Présente les différentes actions de Natura 2000
- ❖ En phase de finalisation
- ❖ Mode de diffusion ?



❖ Suivis réalisés en 2016

- Effectué par l'AREMIP
- Prospections terrain et analyses
- Caractérisation : composé par différents habitats humides


❖ Suivis prévus pour 2018

- Effectué par l'AREMIP (4 jours de prévus)
- Objectifs : définition de la surface de la zone humide et préciser les enjeux écologiques
- Actions à réaliser : Etudes de la végétation, des habitats et du réseau hydrologique



Suivi de toute la ZH (une partie est hors site Natura 2000).

**Rectification du périmètre
Natura 2000 possible ?**





Etude de Lisa TESSIER (Agro Paris-Tech)

Sujet : Etude de l'utilisation passée et actuelle de l'estive d'Aumède - la Labasse (vallée d'Estaing).

- ❖ Histoire et évolution de l'agriculture dans la vallée d'Estaing : au cours des années 30-40 à 60 et 60 à 80.
- ❖ Utilisation passée des estives de la vallée d'Estaing
- ❖ Evolution de l'utilisation de l'estive de la Labasse
- ❖ Reconquête de l'estive de la Labasse : outils mis en place, mise en place des éleveurs laitiers, utilisation actuelle.



Etude de Thomas LATTUGA (CBN PMP)

⇒ Evaluation de l'impact du pâturage sur la flore de l'estive d'Aumède - Labasse



Estive d'Aumède-Labassa




Estive d'Aumède-Labassa

Sujet de stage

Evaluer l'impact de la gestion pastorale sur la
flore de l'estive

Localisation :



Thématique 1

- Evolution de la végétation



A l'échelle de l'estive

« Identifier les grands ensembles paysager »



Paysage2016 paysage2016 Polyqon


crip



Thématique 1

- Evolution de la végétation
A l'échelle de l'estive
A l'échelle du sous-quartier

« Représenter de manière précise l'évolution des habitats »



Légende

- Bois
- Eboulis
- Landes buissonnantes
- Pelouses
- Pelouses formés de landes rases
- Pelouses formés de landes rases et buissonnantes
- Plantations de conifères
- Pelouses formés de landes buissonnantes
- Landes rases
- Bois semi-ouvert

50 0 50100 m




Thématique 2

- Enquêtes


Recherche de photos
anciennes

« Appuyer les
observations des photo-
aériennes »

1985/90



2018




Thématique 2

- Enquêtes

Recherche de photos
anciennes

Utilisation passée de
l'estive

1985/90



Thématique 3

- Suivis de végétation
Linéaire ou surfacique

« Suivre de façon pérenne
les changements de
végétation dus à une
évolution naturelle ou
pastorale »



Thématique

- Fiches de présentation des quartiers d'estive

Fiche n°1 Sous quartier
d'estive XX

Carte
de la

d'évolution
végétation

PHOTOS

PHOTOS

OBSERVATION :

INTERPRETATION :

DYNAMIQUE D'EVOLUTION :



Etude de Thomas LATTUGA (CBN PMP)



Evaluation de l'impact du pâturage sur la flore de l'estive d'Aumède - Labasse



Equipements pastoraux

QUESTIONS DIVERSES



Merci pour votre participation...

