

Formations à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires

CB : 31.88

UE : 5130

LANDES ALPINES ET BOREALES

ANNEXE I (DIRECTIVE HABITATS)

STATUT

Habitat d'intérêt communautaire

LOCALISATION SUR LE SITE

Sur le bas du versant nord, en particulier au niveau de **Barbat** à Arbéost et en bas du versant sur la rive gauche de **Bouleste**.

SUPERFICIE ET OCCURENCE

Surface totale : 55,63 ha (1,86 % du site)

Superficie moyenne : 3,5 ha (min 0,3 – max 14,1)

Nombre d'unité : 16 unités

Habitat unique : 5

Mosaïque : 5

Mélange : 6



Lande à genévrier – photo PNP – C. Brau-Nogué

CONDITIONS STATIONNELLES

Altitude moyenne : 1 610 m (1 300 - 1 900 m)

Exposition préférentielle : indifférente

Substrat : indifférent

Topographie : surtout en bas de versants

DESCRIPTION DE L'HABITAT

Formations de landes dominées des arbrisseaux sempervirents xérophiles parmi lesquels domine de façon importante le Genévrier commun. Landes des étages inférieurs apparaissant de manière progressive en marge des secteurs pâturés généralement sur les zones les moins fréquentées souvent au niveau des pentes plus fortes.

ESPECES CARACTERISANT CET HABITAT

<i>Juniperus communis</i>	<i>Asphodelus albus</i>
<i>Erica vagans</i>	<i>Bupleurum falcatum</i>
<i>Asperula cynanchica</i>	<i>Anthoxantum odoratum</i>
<i>Festuca paniculata</i>	

DECLINAISON PHYTOSOCIOLOGIQUE

Rattachement phytosociologique encore imprécis

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

Etat de conservation : Bon (81%)

Sens d'évolution : Stable (44%)


La croissance du Genévrier est particulièrement lente, elle génère des milieux stables en apparence, inscrits dans une faible dynamique. Le recouvrement peut être important en raison de la part prise par les individus à port prostré. A terme, des ligneux plus hauts peuvent se développer dans la lande et conduire à une formation arborée. Des sorbiers notamment peuvent participer à cette dynamique

VALEUR D'USAGE

Valeur pastorale : La lande à Genévrier nain possède un potentiel fourrager directement lié au degré de fermeture. Jusqu'au 50 % de recouvrement, ces milieux peuvent être parcourus par les troupeaux qui trouvent entre les ligneux une ressource exploitable. Au-delà de ce niveau de recouvrement la lande devient impenétrable pour le bétail et son intérêt pastoral devient très faible à nul, du fait de la très faible productivité de la strate herbacée.


ESPECES PATRIMONIALES LIEES A CET HABITAT

Seules les landes les moins denses (jusqu'à 70 % de recouvrement) présentent un intérêt comme habitat d'espèces pour certains oiseaux comme la **Perdrix** (*Perdix perdix*) ou encore le **Grand Tétrás** (*Tetrao urogallus*)



Légende

-  Réseau hydrographique (Hors site)
-  Route
-  Pic
-  Village
-  Lac (Hors site)
-  Limite du site

 Unité d'habitat délimitée sur le terrain

Etat de conservation

-  Bon
-  Moyen
-  Mauvais

Lac de Migouélou

1 kilomètre